

Avertissements agricoles

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 3 C du 17/03/98

GRANDES CULTURES N° 3

COLZA : MELIGETHES : RARES à contrôler
BLE DUR : OIDIUM + ROUILLE : TRAITEZ
BLE TENDRE ET ORGE : à surveiller
POIS : Semis tardifs : surveiller les sitones

COLZA

La plupart des parcelles sont aux stades D2 - F1.

Elles sont encore au stade sensible aux **Méligèthes** qui consomment essentiellement les boutons floraux. Au stade pleine floraison (> 50 % de fleurs ouvertes) le traitement devient inutile.

Dans l'ensemble nous avons constaté une présence assez faible de ce ravageur.

Quelques colonies de pucerons sont déjà visibles en général sur les bordures des parcelles.

Un traitement **Méligèthes** pourra limiter leur extension.

Vous pouvez visiter vos parcelles si vous constatez la présence de :

- * 1 **Méligèthe** par pied au stade D1;
- * 2-3 **Méligèthes** par pied au stade E.

INTERVENEZ alors :

TALSTAR FLO	0,125	L/Ha
BAYTHROID	0,2	L/Ha
DUCAT	0,2	L/Ha
DECIS MICRO	0,08	L/Ha
KARATE XPRESS	0,1	L/Ha

BLE DUR

Stades : Semis Mi à Fin Octobre : 2-3 noeuds

Semis Mi Novembre (la grande Majorité) : 1 à 2 noeuds

Semis plus tardif Fin Novembre Début Décembre : Redressement à 1 noeud.

Septoriose : Dans l'ensemble absente sauf quelques symptômes observés dans le Nord Ouest de la zone (S. Tritic) sur les feuilles inférieures.

Nous avons trouvés de la **Rouille Jaune** sur Acalou et Ixos.

Surveillez particulièrement ces variétés (et les autres) et en cas de présence, **Intervenez immédiatement**.

L'**Oïdium** est présent quasiment dans toutes les parcelles, le plus souvent sur les feuilles de la base. Quelques situations sont plus évolutives (Sillon).

Sur le complexe parasitaire, le plus fréquent (**Oïdium - Rouille Brune**) vous pouvez intervenir si nécessaire avec :

EOLE W G	0,750	KG
OPUS	1	L
CAPITOLE	1,5	L

Auquel vous pouvez associer une Morpholine

BOSCOR	0,5	L
OU		
CORBEL	0,5	L



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
 SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 ZAC D'ALCO - B.P. 3056
 34034 MONTPELLIER CEDEX 01
 Tél. : 04 67 10 19 50 - Fax : 04 67 03 10 21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
 IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
 LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'INSCRIPTION 531 AD
 ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
 Trésor Public de l'Hérault 00001003365

La Rouille Brune est également présente mais de façon peu intense en général et plutôt limitée aux étages inférieurs.

Pour des cultures encore tardives (stade 1 noeud) et sur précédent blé vous pouvez, si vous le souhaitez viser spécifiquement le complexe maladies du pied (fusariose et piétin échaudage).

Si vous souhaitez utiliser une Strobilurine nous vous rappelons que cette famille chimique s'emploie en préventif de maladies.

Une intervention au stade 2-3 noeuds peut assurer une bonne protection sur les nouvelles feuilles avec une remanence intéressante.

BLE TENDRE

Leur situation sanitaire est dans l'ensemble correcte. Surveillez plus particulièrement la variété VICTO vis à vis de la Rouille Jaune.

ORGE

Stade moyen 2 noeuds. Nous avons constaté dans certaines parcelles la présence d'Oïdium mais aussi de Rouille Naine.

POIS

Stade 8-10 feuilles : Si pas de nouvelles encoches ne pas intervenir.

Semis tardifs (Février) : stade 3-4 feuilles : intervenir si présence de nouvelles encoches sur les nouveaux folioles.

Si vous le souhaitez vous pouvez utiliser également une Strobilurine (stade 2-3 noeuds) pour une protection des nouveaux organes. (Application préventive).

NB :

Pour les parcelles ayant reçu un traitement de semences REAL normalement la protection devrait être encore suffisante contre les maladies et permettre d'attendre de nouveaux avis.

En cas de développement, en particulier de l'oïdium, vous pouvez intervenir si nécessaire avec une Morpholine :

Utilisez une spécialité à base de Carbendazime (consultez votre coopérative).

Dans cette optique (Oïdium et Rouille pour l'instant sur les feuilles inférieures) vous pouvez utiliser :

OGAM	1	L
------	---	---

Si nécessaire (complexe Oïdium et Rouille Brune) se reporter Blé Dur.

Intervenez immédiatement si découverte de foyers de Rouille Jaune

Une intervention peut s'envisager

OPUS	1	L
CAPITOLE	1,5	L

Auquel vous pouvez associer une morpholine

BOSCOR	0,5	L
CORBEL	0,5	L

AMISTAR PRO	2	L
-------------	---	---

Se reporter au bulletin précédent.